

理解度チェック

第5章 ● ホームインフュージョン

1 正しいものには○、間違っているものには×をつけてください。

記入欄	問題
	① 弟も血友病なので自分に処方された製剤を貸してあげた。
	② 製剤は日当たりのよい窓辺に置いておいたほうが良い。
	③ 使用期限が過ぎていたが、もったいないので使用した。
	④ どんな時でも製剤は保冷バッグにいれて持ち運ばなければならない。
	⑤ バイアルを見たらひびが入っていたので、使わないで病院に返却した。
	⑥ 翌朝にすぐに投与する予定なので、寝る前に製剤を溶解しておいた。
	⑦ 自己注射ができるので、病院には家族が製剤をもらいに行くだけだ。
	⑧ 注射器は、毎回新しいものを使用する。
	⑨ 針先が机に触れてしまったが、そのまま使用した。
	⑩ 自己注射をする前には必ず手を洗う。
	⑪ 製剤をしっかり溶解するためには、泡だつように強く製剤バイアルを振る。
	⑫ 溶解した製剤バイアルの中に溶けていない物が見えたので、しばらくていねいに溶かしていたが、やはり残っているので、使わないで病院に返却した。
	⑬ 駆血帯は、強くしめればしめるほどよい。
	⑭ 痛みが激しいので、早く投与するために消毒をしないで針を刺した。
	⑮ 製剤の投与速度は、製剤ごとに決まっている。
	⑯ 投与中に副作用(吐き気、かゆみ、呼吸困難など)が出現したら、すぐに中止して主治医に連絡をする。
	⑰ 自己注射で使用したものは、すべて家庭ごみとして捨てる。
	⑱ 投与記録はすぐには書かず、月に1回まとめて書けばよい。
	⑲ 製剤はあればあるほど良いので、家庭の在庫量は気にしなくても良い。

理解度チェック

第5章 ● ホームインフュージョン

1 正しいものには○、間違っているものには×をつけてください。

記入欄	問題
×	① 家族といえども製剤の流用はしてはいけません。
×	② 急激な温度変化のある場所には保管してはいけません。
×	③ 投与前に必ず使用期限を確認しましょう。
×	④ 短時間の場合は保冷バッグは必要ありません。
○	⑤ 投与前に必ず瓶を確認しましょう。
×	⑥ 溶解後1時間以上経過した製剤は使用しないようにしましょう。
×	⑦ 言語道断です。最低3ヶ月毎の定期受診は約束です。
○	⑧ 清潔なものを使用しましょう。
×	⑨ 新しい針に変えましょう。不安な人は替えの針を主治医から処方してもらっておくと良いでしょう。
○	⑩ 清潔を心がけましょう。
×	⑪ 円をえがくように、ゆっくりやさしく溶かしましょう。
○	⑫ こんなときは新しいバイアルを使用しましょう。
×	⑬ しめすぎると血の流れが止まってしまう。
×	⑭ なんてことを!清潔に!清潔に!
○	⑮ 投与速度は確認しておきましょう。
○	⑯ そんな時のためにも、そばに電話を置いておきましょう。
×	⑰ 針、注射器、バイアルは病院へ!地域によって、ごみ処理のルールは少し違いますので、どのように処理をすれば良いか、主治医とよく相談して決めておきましょう。
×	⑱ そんなことしたら忘れちゃいますよね!
×	⑲ <small>すいどう</small> 出納表をつけて管理しましょう。